


Pancreaskanker

Omdat een vroege behandeling belangrijk is!



- In 2019 waren er in België 2028 diagnoses van pancreaskanker.
- Pancreaskanker is een relatief zeldzame vorm van kanker die een specialistische vorm van behandeling vraagt. De chirurgische verwijdering van het letsel biedt nog steeds de enige kans op genezing.
- De ziekenhuizen in België vinden het belangrijk om de kennis en ervaring zoveel mogelijk te concentreren. Dit heeft geleid tot de keuze om alle chirurgische ingrepen te laten plaatsvinden in slechts enkele centra in het land. De keuze voor de oprichting van deze gespecialiseerde Pancreascentra komt de kwaliteit en snelheid van de zorg ten goede.
- In de Pancreascentra werken specialisten uit de vakgebieden interne geneeskunde, chirurgie, oncologie (kankergeneeskunde), radiotherapie, radiologie en pathologie nauw met elkaar samen en staan zo garant voor een complete behandeling en begeleiding met behulp van de modernste technieken.
- Deze teams stemmen de behandeling af op de patiënt en dit vanaf de opname, via onderzoeken en operatie tot aan het ontslag en de nazorg.



2028 diagnoses pancreaskanker op 71651 kankerdiagnoses in 2019 in België

- De pancreas of alvleesklier is langwerpig van vorm en ligt boven in de buikholte, tussen de maag en de ruggengraat. Onder de pancreas ligt de dunne darm. De pancreas bestaat uit twee soorten klieren: de exocriene klieren en de endocriene klieren.
- De **exocriene klieren** scheiden pancreassap af. Dat sap bevat enzymen die het lichaam nodig heeft om voedsel te verteren.
- De **endocriene klieren** maken hormonen aan. Die beïnvloeden de stofwisseling, de spijsvertering en het functioneren van de darmen. Een voorbeeld van zo'n hormoon is insuline, de stof die onder andere de hoeveelheid suiker in het bloed regelt.
- In het merendeel van de gevallen ontstaat het gezwel in de exocriene klieren. Een tumor in de pancreas kan ook ontstaan in de endocriene klieren, maar dat is dan geen klassieke 'pancreaskanker'.
- De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 2028 nieuwe gevallen van pancreaskanker, waarvan 1041 bij mannen en 987 bij vrouwen. Pancreaskanker kan op alle leeftijden voorkomen, maar vooral bij mensen boven de 60 jaar.



Pancreaskanker opsporen

- In een vroeg stadium veroorzaakt pancreaskanker nauwelijks klachten. Naarmate de tumor groeit, neemt de kans op klachten toe.
- De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op pancreaskanker: pijn boven of in het midden van de buik of de rug, geelzucht (met vooral een gele kleur van de huid en de ogen), gewichtsverlies, spijsverteringsproblemen, verminderde eetlust, misselijkheid en braken. Deze symptomen wijzen echter niet altijd op kanker. Er zijn veel andere ziekten met gelijkaardige symptomen.
- De huisarts zal bij een of meer van bovenstaande klachten het lichaam onderzoeken. Vervolgens zal hij waarschijnlijk een onderzoek van het bloed en de stoelgang voorstellen om de werking en de conditie van de pancreas te meten. Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van pancreaskanker, zal hij u doorverwijzen naar een specialist.
- Als de ziekte beperkt is gebleven tot de pancreas en niet is uitgezaaid, zal de behandelend arts wellicht een curatieve behandeling voorstellen. Een curatieve behandeling is gericht op de genezing van de patiënt. Bij een uitgezaaide pancreaskanker wordt een palliatieve behandeling voorgesteld. Dat is een behandeling die de ziekte niet geneest, maar ze kan de tumorgroei wel afremmen en/of klachten verminderen.

PANCREAS VLAANDEREN VZW


Pancreas Vlaanderen is een vereniging voor mannen en vrouwen met pancreaskanker en hun naasten. Lotgenotenondersteuning staat hier centraal waarbij deze een aanvulling kan zijn voor de professionele hulpverlening. Ze willen informatie delen met de patiënten, familieleden en naasten. Ook wil de vereniging de ziekte via campagnes onder de aandacht brengen en werven ze fondsen voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer info via www.pancreasvlaanderen.be

PANCREASKANKER

Omdat weten belangrijk is!

De pancreas ligt dwars in de buik, tussen de maag en de ruggengraat. Deze klier is noodzakelijk voor een goede bloedsuikerspiegel en spijsvertering.



ENKELE BELANGRIJKE CIJFERS



STEDS MEER VOORKOMENDE KANKER

In 2019 werden in België 2028 mensen gediagnosticeerd met pancreaskanker.



TYPISCHE OUDERDOMSZIEKTE

De ziekte komt het vaakst voor bij mensen boven de 65 jaar, en evenveel bij mannen en vrouwen.



HOOG STERFTECIJFER

Vijf jaar na de diagnose is gemiddeld maar 5% van de patiënten nog in leven.

DE SYMPTOMEN



Geelzucht



Onverklaarbaar gewichtsverlies



Diabetes



Opgeblazen gevoel



Buik- en rugpijn



Misselijkheid en overgeven



Vermoeidheid



Lichtgekleurde stoelgang



Verandering in kleur van de urine



Verminderde eetlust

RISICOFACTOREN



Leeftijd



Familiale voorgeschiedenis



Overgewicht



Roken

BEHANDELINGEN



Chirurgie



Chemotherapie



Radiotherapie

DOORBREEK SCHAAMTE EN STILTE - SPREEK EROVER MET UW ARTS



PANCREAS
VLAANDEREN
VZW